

KGMP 일반의약품

터나빈 겔 (테르비나핀)

■ 원료약품 및 분량 : 이 약 1g 중

- 유효성분: 테르비나핀(별규).....10mg
- 첨가제(보존제): 벤질알코올.....2mg
- 기타첨가제: 미리스트산아이스프로필, 솔비탄모노스테아레이트, 수산화나트륨, 에탄올, 정제수, 카르보머940, 폴리소르베이트60

■ 성 상 : 흰색 또는 회백색의 겔제

■ 효능·효과

1. Trichophyton(족, T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부 사상균에 의한 피부진균(곰팡이) 감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴부 백선), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare(Malassezia furfur)에 의한 전풍(여루러기)

■ 용법·용량

사용방법: 이 약은 1일 1회 적용한다. 적용 전에 감염부위를 깨끗하게 씻고 말린 후 감염부위 및 그 주위에 얇게 바른다. 간찰성 감염(유방 밑, 손, 발가락 사이, 둔부(엉덩이) 사이, 서혜부)의 경우, 야간에는 거어즈를 덮어 사용할 수도 있다. 치료기간: 1일 1회 1주 증상의 경감은 통상 2~3일 이내에 나타난다. 불규칙한 사용 또는 조기 투약중지 시 재발의 위험성이 있다. 1주일 투약 후에도 증상이 개선 징후가 없다면 진단을 확인해 보아야 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것.
테르비나핀 및 이 약 성분에 대해 과민증의 전력이 있는 환자
2. 부작용
 - 1) 피부 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은반점), 가려움, 자극감이 적용부위에 나타날 수 있다.
3. 임부, 수유부에 대한 사용
 - 1) 동물에 대한 생식독성시험에서 태자독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임부에 투여하는 경우에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)하는 경우에만 투여할 것.
 - 2) 이 약은 모유 중에 분비되므로, 이 약을 투여 중인 수유부는 수유를 중지할 것.

4. 어린이에 대한 투여

어린이에 대한 사용경험이 제한적이므로 투여하지 말 것.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용할 것.
- 2) 눈 주위에는 사용하지 말 것.

※ 저장방법 : 기밀용기, 30℃이하 저장

※ 포장단위 : 15g/튜브

※ 제품문의처 : 080-601-0080

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서 최종개정연월일 : 2021.01.27

※ 이 제품 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 검색란'을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

제조사 (주)제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245