

판토시딜캡슐

[원료약품 및 분량] 이 약 1캡슐 중

- 유효성분:
약용효모(별규) 100mg
케라틴(별규) 20mg (총 아미노산으로서 히스티딘 1.22mg, 류신 4.91mg, 리신 4.1mg)
티아민질산염(KP) 60mg
판토텐산칼슘(KP) 60mg
L-시스틴(KP) 20mg
P-아미노벤조산(USP) 20mg
- 첨가제(타르색소): 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호
- 첨가제(동물유래성분): 케라틴(기원동물: 돼지, 사용부위: 발톱),
젤라틴(1)기원동물:소, 사용부위: 가죽 2)기원동물: 돼지, 사용부위: 가죽)
- 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 캡슐제, 폴리이드성아산화규소, 크로스프비돈

[성상] 연회색 가루의 내용물이 든 상부는 녹색, 하부는 미황색의 불투명한 경질캡슐제

- [효능·효과]
1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
 2. 탈모의 보조치료

- [용법·용량]
- 성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.
12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1 ~ 2회 식후에 복용한다.
12세 미만은 복용하지 않는다.

- [사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
2) 12세 미만 소아
 2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조
2) 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우
3) 정해진 용법·용량대로 3 ~ 4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않을 경우
 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.
3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.
4) 평균 치료 기간은 3 ~ 6개월이다.
 5. 저장상의 주의사항
1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관
[포장단위] 90캡슐[(10캡슐/PTP X 9)X 1Box], 180캡슐[10캡슐/PTP X 9) X 2Box]
[제품문의처] 080-601-0080
[제조의뢰자] (주)제뉴원사이언스 세종특별자치시 전의면 산단길 245
[제조자] ㈜마더스제약 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 설명서 최종개정연월일 : 2021.01.18
- ※ 이 제품 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 검색'란을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약약품안전관리원(1644-6223)

